

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

センナダイオウ錠S

（便秘薬）



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の便秘薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （4）次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

- ・便秘
- ・便秘に伴う次の症状の緩和
頭重、のぼせ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

なるべく空腹時に水又はお湯にて服用すること。

服用間隔は4時間以上おくこと。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	5～6錠	3回を限度とする
11歳以上15歳未満	3～4錠	
11歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品18錠（成人の1日最大量）中、下記生薬を含有します。

セ ン ナ 末 1.0g

ダイオウ末 2.0g

添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、タルク及びステアリン酸Mgを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室

電 話 03-3843-3833

受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）