

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しょう かく さん 松 鶴 散

（胃腸薬）

- ◆「松鶴散」は胃痛、胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、げっぷ、胃重、胃もたれ、胃部膨満感、食欲不振、消化不良、胃弱、腹部膨満感、食べすぎ、はきけ、嘔吐を改善するために創りました弊社独自の製剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる）
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- （4）胃腸が弱く下痢しやすい人。
- （5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- （6）次の診断を受けた人。 腎臓病、甲状腺機能障害
- （7）次の医薬品を服用している人。 便秘薬（下剤）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

軟便、下痢

4. 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

胃痛、胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、げっぷ、胃重、胃もたれ、胃部膨満感、食欲不振、消化不良、胃弱、腹部膨満感、食べすぎ、はきけ、嘔吐

用法・用量

食前又は食間に水又はお湯にて服用

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	1 包 (1.5g)	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包 (1.0g)	
8歳以上11歳未満	1/2包 (0.75g)	
5歳以上 8歳未満	1/3包 (0.5g)	
3歳以上 5歳未満	1/4包 (0.375g)	
3歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品3包（1包1.5g）中、下記成分を含有します。

炭酸水素ナトリウム	1.38g	リン酸水素カルシウム	1.035g
酸化マグネシウム	0.69g	ケ イ ヒ 末	0.4g
オ ウ バ ク 末	0.18g	シ ョ ウ キ ョ ウ 末	0.105g
ピ ャ ク ジ ュ ッ 末	0.105g	ダ イ オ ウ 末	0.1g
セ ン プ リ 末	0.05g	チ ン ピ 末	0.35g
キ ジ ッ 末	0.105g		

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 本剤には、アルカリ性の酸化マグネシウム等とダイオウが同時に配合されているため、製品が次第に赤褐色に変わることがありますが、無害で薬効には影響ありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7