



服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しょう かく しょう うん  
**松 鶴 照 雲**

（漢方製剤）

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

**次の人は服用しないこと**

生後3ヵ月未満の乳児。



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - （1）医師の治療を受けている人。
  - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

\*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**\*4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**効能・効果**

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1包(2.2g)	3回
7歳以上15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上4歳未満	成人の1/3量	
2歳未満	成人の1/4量以下	

食間とは…  
食後2～3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品3包(6.6g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)1.60gを含有します。

トウキ	----- 0.75g	シャクヤク	----- 0.75g	センキュウ	----- 0.75g
シオウ	----- 0.75g	オウレン	----- 0.75g	オウゴン	----- 0.75g
オウバク	----- 0.75g	サンシシ	----- 0.75g	レンギョウ	----- 0.75g
ケイガイ	----- 0.75g	ポウフウ	----- 0.75g	ハッカ	----- 0.75g
キシツ	----- 0.75g	カンゾウ	----- 0.50g	ビャクシ	----- 0.75g
キキョウ	----- 0.75g	サイコ	----- 0.75g		

添加物として乳糖水和物を含有します。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室  
電話 03-3843-3833  
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7