

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

じゅん けつ とう
順 血 湯

（生薬製剤）

- ◆「順血湯」は脳溢血、眩暈、頭痛、耳鳴を改善するために、9種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸の弱い人。
(4) 高齢者。
(5) 次の症状のある人。
むくみ
(6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

脳溢血、眩暈^{※)}、頭痛、耳鳴

^{ばんらん}
※)「眩暈」とは、めまいのことを示します。

用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 50mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 日分の 1/3 量	3 回
15 歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後 2～3 時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。

成分・分量

本品 1 包（25g）中、下記生薬を含有します。

ニ ン シ ン	----- 3.0g	シ ャ ク ヤ ク	----- 3.0g
ソ ウ ジ ュ ツ	----- 3.0g	ト ウ キ	----- 3.0g
カ ン ソ ウ	----- 1.0g	セ イ ヒ	----- 3.0g
キ ッ ビ	----- 3.0g	ビ ャ ク シ	----- 3.0g
ウ ヤ ク	----- 3.0g		

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7