


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

じゅん せい
順 成（エキス顆粒）
（漢方製剤）

 **使用上の注意**



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）高齢者。
- （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- （5）次の症状のある人。
むくみ
- （6）次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3. 1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症：神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1 包 (2g)	3 回
7歳以上15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3量	
2歳未満	成人の1/4量以下	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包(1包2.0g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)1.3gを含有します。

ケ イ ヒ	1.5g	シャクヤク	1.5g
タ イ ソ ウ	1.5g	ボレイ末	1.5g
カ ン ソ ウ	1.0g	ショウキョウ	0.5g
リュウコツ末	1.0g		

添加物として乳糖及びバレイシヨデンブンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)